

## Tabel Isolatie-indicatie

### SRI-richtlijn Isolatie in de langdurige zorg

Een overzicht van micro-organismen en de bijbehorende indicatie voor isolatie (op alfabetische volgorde).

- Indien er meerdere maatregelen zijn genoemd, pas dan de meest intensieve/strengste maatregelen toe.  
Zie module Aanvullende infectiepreventiemaatregelen van deze richtlijn.

Infectieziekte of kolonisatie	Micro-organisme	Overdracht	Risico-inschatting	Type isolatie en maatregelen	Duur isolatie
Acute luchtweginfectie*	Onbekende verwekker	Druppel en contact	Zie verwekker waarvoor wordt verdacht	Druppel en contact	Indien verwekker aangetoond, zie verwekker.  Indien de verdenking is vervallen of indien er geen verwekker met een isolatie-indicatie is aangetoond, dan vervalt de indicatie
Adenovirusinfectie	Adenovirus	Druppel en contact	Personen die niet hygiëne bewust zijn	Druppel en contact	Tot genezing
Angina, keelontsteking, faryngitis, tonsillitis pneumonie*	<i>Streptococcus pyogenes</i> (streptokok groep A)	Druppel en contact		Druppel en contact	Tot 24 uur na start effectieve therapie
Bacteriële luchtweginfectie*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Burkholderia cepacia</i></li> <li>• Meningokokken, <i>Neisseria meningitis</i></li> <li>• Multiresistente micro-organismen</li> </ul>	Druppel en contact		Druppel en contact	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tot klinisch herstel, n.v.t. bij dragerschap. Uitzondering: Transmissie van CF-patiënten die wel drager zijn van <i>B.cepacia</i> naar CF-patiënten die dat niet zijn wordt middels isolatie voorkomen.</li> <li>• Tot 24 uur na start effectieve therapie.</li> </ul>

Infectieziekte of kolonisatie	Micro-organisme	Overdracht	Risico-inschatting	Type isolatie en maatregelen	Duur isolatie
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Zie richtlijn BRMO in de langdurige zorg</li> </ul>
BRMO	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Acinetobacter calcoaceticus-baumannii</i> complex, carbapenemase</li> <li><i>Candida auris</i></li> <li>Enterobacterales, geen carbapenemase</li> <li>Enterobacterales, carbapenemase (CPE)</li> <li><i>Enterococcus faecium</i>, vancomycine-resistentie (VRE)</li> <li><i>Pseudomonas aeruginosa</i></li> <li>Multiresistente micro-organismen</li> </ul>	Richtlijn BRMO in de langdurige zorg			
<i>Clostridioides difficile</i> -infectie	<i>Clostridioides difficile</i>	<i>Clostridioides difficile</i> richtlijn			
Conjunctivitis	Adenovirus of andere virale verwekkers	Contact		Contact	Tot klinisch herstel
COVID-19, SARS-CoV-2*	SARS-CoV virussen	Druppel	Aerogeen bij aerosolvormende handelingen	Druppel en contact (aerogeen bij aerosolvormende)	<a href="#">Behandeladvies COVID-19</a>

Infectieziekte of kolonisatie	Micro-organisme	Overdracht	Risico-inschatting	Type isolatie en maatregelen	Duur isolatie
				nde handelingen)	
Difterie*	<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	Contact	Cutaan	Contact	2x negatieve kweken na 48 uur staken antibiotische therapie
		Druppel en contact	Luchtweegen	Druppel en contact	
Echovirusinfectie	Echovirus	Druppel en contact	Bij heftige diarree/braken ook via druppels	Druppel en contact	Tot einde diarree/braken
Enterovirus infectie <b>zonder</b> neurologisch beeld	Enterovirus	Contact	Personen die niet hygiënebewust zijn	Contact	Tot einde klachten
Enterovirus infectie <b>met</b> neurologisch beeld Acute Flaccid Myelitis (AFM, acute slappe paralyse)	Enterovirussen: uit typering blijkt Enterovirus type D68	Druppel en contact	Bij heftige diarree/braken ook via druppels	Druppel en contact	Tot einde diarree/braken, daarna contactisolatie tot 7 weken na de eerste ziektedag
Erysipelas*	<i>Streptococcus pyogenes</i> (streptokok groep A)	Contact		Contact	Tot 24 uur na start effectieve therapie
Fasciitis necrotians	<i>Streptococcus pyogenes</i> (streptokok groep A)	Contact		Contact	Tot 24 uur na start effectieve therapie en klinisch herstel
Folliculitis	<i>Staphylococcus aureus</i>	Contact	Personen die niet hygiëne bewust zijn	Contact	Tot herstel

Infectieziekte of kolonisatie	Micro-organisme	Overdracht	Risico-inschatting	Type isolatie en maatregelen	Duur isolatie
Gastro-enteritis*	Adenovirus infectie Astrovirus <i>Escherichia coli</i> , entero-hemorrhagisch (EHEC/STEC) Onbekende verwekker	Druppel en contact	Bij heftige diarree/braken ook via druppels	Druppel en contact	Tot einde klachten. Voor Astrovirus zie SRI richtlijn Noro virus. Bij onbekende verwekker zie verwekker waarvoor wordt verdacht.
Gordelroos/Herpes Zoster*	Varicella Zoster Virus	Contact	Dermatoom niet afdekbaar	Contact	Tot de laatste blaasjes zijn ingedroogd Mogelijk risico zwangeren.
Griep/Influenza*	Influenza A of B, aviaire of para influenza virussen	Druppel en contact		Druppel en contact	Tot klinisch herstel
Hepatitis A	Hepatitis A virus	Feco-oraal		Contact	Tot 1 week na ontstaan van symptomen
Hepatitis E	Hepatitis E virus	Feco-oraal		Contact	Tot negatieve PCR op feces
Herpes simplexvirus infectie	Herpes simplexvirus	Contact	Gedissemineerd Mucocutaan ersntig	Contact	Tot korstvorming
Hoofdluis	Luizen	Contact		Contact	Tot herstel-tot-ontluizing

Infectieziekte of kolonisatie	Micro-organisme	Overdracht	Risico-inschatting	Type isolatie en maatregelen	Duur isolatie
Impetigo*/Krentenbaard	<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Streptococcus pyogenes</i> (streptokok groep A)	Contact	Personen die niet hygiëne bewust zijn of indien niet afdekbaar	Contact	Tot 48 uur na start effectieve therapie of tot laesies zijn ingedroogd
Humaan metapneumovirus infectie	Humaanmetaphnemovirus	Druppel en contact		Druppel en contact	Tot klinisch herstel
Invasieve streptokokkeninfectie (fasciitis necroticans, sepsis)	<i>Streptococcus pyogenes</i> (streptokok groep A)	Contact		Contact	Tot 24 uur na start effectieve therapie
Mazelen*^	Mazelen virus	Aerogeen en contact		Aerogeen en contact	T/m 4 dagen na het uitbreken van het exantheem.  Immuungecompromitteerden: gedurende gehele ziekteperiode.
Meningoencefalitis	<i>Haemophilus influenzae</i> type B <i>Neisseria meningitidis</i> Nog onbekende verwekker	Druppel en contact	Druppel i.v.m. keeldragerschap	Druppel en contact	Tot 24 uur na start effectieve therapie Bij onbekende verwekker: Tot negatieve kweek of tot verwekker bekend is. Volg dan beleid van de verwekker.
Mpox	Monkeypoxvirus	Druppel en contact		Druppel en contact	Tot alle korstjes van de huid zijn gevallen en er geen overige klachten meer aanwezig zijn
MRSA	Methicilline-resistente <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	Richtlijn MRSA in de			

Infectieziekte of kolonisatie	Micro-organisme	Overdracht	Risico-inschatting	Type isolatie en maatregelen	Duur isolatie
		langdurige zorg			
Norovirus*	Norovirus	Richtlijn Norovirus in de langdurige zorg			Tot minimaal 48 uur na de laatste klachten. Zie ook Module 1.2 Isolatieduur Norovirus
Polio	Poliovirus	Druppel en contact		Druppel en contact	Tot 7 weken na aanvang klachten
Roodvonk*	<i>Streptococcus pyogenes</i> (streptokok groep A)	Druppel en contact		Druppel en contact	Tot 24 uur na start effectieve therapie
Rotavirusinfectie	Rotavirus	Druppel en contact		Druppel en contact	Tot einde klachten
RS-virus infectie	Respiratoir syncytieel virus (RS-virus)	Druppel en contact		Druppel en contact	Tot klinisch herstel
Salmonellose (incl. tyfus, paratyfus)*	<i>Salmonella typhi</i> , <i>Salmonella paratyphi</i> , non-typhoidal <i>Salmonellae</i>	Contact	Personen die niet hygiënisch bewust zijn	Contact	Tot einde klachten
Scabiës of Scabiës crustosa	Scabiësmijt	Scabiës richtlijn			
Shigellosis, dysenterie*	<i>Shigella dysenteriae</i>	Contact		Contact	Tot einde klachten
Virale luchtweginfectie*	Coxsackievirus Enterovirussen	Druppel en contact	-Personen die niet hygiënebewust zijn	Druppel en contact	Tot klinisch herstel
Waterpokken*	Varicella Zoster Virus	Aerogeen en contact		Aerogeen en contact	Tot de laatste blaasjes zijn ingedroogd

**\*Van toepassing voor de thuiszorg.** Voor de thuiszorg is de isolatie-indicatie niet gericht op het voorkomen van transmissie in de omgeving. De cliënt en eventuele huisgenoten maken immers gebruik van hetzelfde sanitair en materialen en isolatie is veelal niet mogelijk/wenselijk. De algemene voorzorgsmaatregelen en infectiepreventiemaatregelen m.b.t. reiniging en desinfectie gelden wel.

^**Immuun status.** Een medewerker die de cliënt in deze isolatie-indicatie verzorgt of verpleegt, dient gevaccineerd te zijn of de infectieziekte te hebben doorgemaakt. Voor meer informatie over bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg, zie [LCI-richtlijn Mazelen](#).

