

Risicocategorieën voor MRSA-dragerschap bij de cliënt

Op indicatie kan de groep cliënten met verhoogd risico op MRSA-dragerschap worden uitgebreid indien er sprake is van specifieke, lokale risicogroepen.

MRSA-risicocategorieën cliënt	
Risicocategorie 1	
MRSA-positieve cliënt	
- De cliënt is bewezen MRSA-positief. - Follow-up cliënt: de MRSA-positieve cliënt onderging behandeling, maar heeft nog geen drie opeenvolgende sets negatieve MRSA-testen met tussenpozen van minimaal zeven dagen (module 4).	
Risicocategorie 2	
Cliënt met hoog risico op MRSA-dragerschap	
Onbeschermd contact: - De cliënt heeft in de afgelopen twee maanden onbeschermd contact gehad met een MRSA-positieve cliënt. - De cliënt had onbeschermd contact binnen de zorgorganisatie, is onderdeel van een ringonderzoek en heeft nog geen negatieve testen. - De cliënt heeft onbeschermd contact gehad buiten de zorgorganisatie: hij/zij is een huisgenoot of partner van een MRSA-positief persoon (MRSA-drager). - De cliënt verbleef in de afgelopen twee maanden in een andere Nederlandse zorgorganisatie op een afdeling waar een MRSA-epidemie heerst(e) en heeft nog geen negatieve testen. Buitenlandse zorginstelling: - De cliënt verbleef in de afgelopen twee maanden langer dan 24 uur in een buitenlandse zorginstelling. - De cliënt verbleef in de afgelopen twee maanden korter dan 24 uur in een buitenlandse zorginstelling én heeft tenminste één risicofactor voor MRSA-dragerschap*. Contact met levende varkens of vleeskalveren of vleeskuikens: - De cliënt heeft de afgelopen 2 maanden contact gehad met bedrijfsmatig gehouden levende varkens/ vleeskalveren/vleeskuikens ongeacht of dit contact beroepsmatig was of niet en/of woont op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden én heeft tenminste één risicofactor voor MRSA-dragerschap (chronische infecties, persisterende huidlaesies, of infectiebronnen zoals abscessen of furunkels). Vluchtelingenopvang: - De cliënt verbleef de afgelopen 2 maanden in een vluchtelingenopvang.	
Risicocategorie 3	

Clïënt met een laag risico op MRSA-dragerschap
Onbeschermd contact: - De cliënt had in de afgelopen twee maanden intensief onbeschermd zorgcontact met een MRSA-positieve medewerker ongeacht de tijdsduur. Buitenlandse zorginstelling: - De cliënt uit Nederland onderging de afgelopen twee maanden hemodialyse in een buitenlandse zorginstelling. - De cliënt verbleef langer dan twee maanden en minder dan 12 maanden geleden in een buitenlandse zorginstelling én heeft tenminste één risicofactor voor MRSA-dragerschap*. Follow-up cliënt: - De MRSA-positieve cliënt heeft drie opeenvolgende negatieve MRSA-sets met tussenpozen van minimaal zeven dagen en is nog in de follow-up periode van 1 jaar na de eerste negatieve test (dus nog niet negatief getest na minimaal 1 jaar). Clïënt met persisterende blootstelling: - De cliënt met persisterende blootstelling had minder dan drie maanden geleden, zoals in de regio vastgesteld, een negatieve MRSA-test.
Risicocategorie 4
Clïënt niet verdacht van MRSA-dragerschap
De cliënt valt niet in één van de drie bovenstaande risicocategorieën.

* Risicofactoren voor MRSA-dragerschap zijn:

- Een invasieve ingreep in een buitenlands ziekenhuis.
- Chronische infecties of persisterende huidlaesies die in de buitenlandse zorginstelling ontstaan zijn en nog steeds aanwezig zijn bij opname in de Nederlandse zorgorganisatie.
- Infectiebronnen zoals abscessen of furunkels die in de buitenlandse zorginstelling ontstaan zijn en nog steeds aanwezig zijn bij opname in de Nederlandse zorgorganisatie.